



НАШ ВЫБОР

в пользу
презвонного
образа
жизни!

Преимущества жизни без алкоголя:

- успешная и счастливая жизнь;
- активная жизненная позиция;
- сохранение здоровья;
- увеличение продолжительности жизни.

ПОМНИТЕ,

алкоголь может не только разрушить ваше здоровье, психику, отношения с семьёй и друзьями, но и сделать невозможными ваши мечты о будущей жизни, благополучии и личном счастье.



РОДИТЕЛИ, СКАЖЕМ СИРОТСТВУ – НЕТ!

Социальное сиротство - это вид детского одиночества, возникшего «при живых родителях», покинувших детей и лишивших их своего попечения.

Причины социального сиротства :

1. Разрыв преемственности поколений.
2. Жестокое обращение с детьми.
3. Рост алкогольной и наркотической зависимостей.
4. Экономическая нестабильность семьи.
5. Конфликты в семье между детьми и родителями.
6. Конфликты в семье между родителями.
7. Негативное влияние средств массовой информации как на членов семьи, так и на детей.



***Благополучная семья – не та, которая не имеет проблем,
а та, которая находит силы их решать.***

***Социальное сиротство можно предупредить заботой
и ориентацией на сохранение семьи и любви к детям.***

Каждый ребенок хочет быть нужным и любимым!

А МОГЛИ БЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ...



Пьют родители: страдают дети.

- ❖ Совокупность аномалий (отклонений) в развитии плода принято называть "алкогольным синдромом плода". Совокупность аномалий (отклонений) в развитии плода принято называть "алкогольным синдромом плода".
- ❖ Для установления диагноза алкогольного синдрома плода необходимо сочетание по меньшей мере следующих клинических признаков:
- ❖ нарушение центральной нервной системы.
- ❖ замедление роста и развития плода.
- ❖ наличие характерных аномалий развития, особенно лицевого черепа,
- ❖ наличие других уродств (конечностей, внутренних органов и др.)
- ❖ Характерный алкогольный синдром у ребенка - аномалия развития черепа, уменьшение глаз, пороки сердца.
- ❖ Нарушения центральной нервной системы - одно из самых типичных признаков алкогольного синдрома плода и отмечаются приблизительно у 80 % детей. Они проявляются:
- ❖ в микроцефалии (уменьшение черепа),
- ❖ в отставании в умственном развитии,
- ❖ в снижении координации движений,
- ❖ в состоянии возбуждения.

Аsthmeal
www.asthmeal.com

PPT4WEB.ru