

Виды и признаки насилия

Виды насилия	Особенности внешнего вида, характер травм	Особенности поведения
Физическое насилие	<ul style="list-style-type: none"> - <i>множественные повреждения</i>: синяки, ссадины, раны, на теле следы пальцев, ремня, ожоги, повреждения внутренних органов или костей, выбитые или расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на губах; - <i>синдром сотрясения</i>: кровоизлияния в глазное яблоко и под оболочки головного мозга без наружных признаков повреждений, потери сознания, рвоты, головные боли; - <i>задержка физического развития</i> (отставание в весе и росте); - <i>признаки плохого ухода</i> (гигиеническая запущенность, неопрятный внешний вид, сыпь). 	<p><i>от 0 до 6 месяцев</i>: малоподвижность, безразличие к окружающему миру, отсутствие или слабая реакция на внешние стимулы, редкая улыбка в возрасте 3-6 мес.</p> <p><i>от 6 месяцев до 1,5 лет</i>: боязнь родителей, боязнь физического контакта со взрослыми, постоянная беспричинная настороженность, плаксивость, замкнутость, печаль, испуг или подавленность при попытке взрослых взять на руки.</p> <p><i>от 1,5 до 3 лет</i>: боязнь взрослых, редкие проявления радости, плаксивость, реакция испуга на плач других детей, крайности в поведении – от чрезмерной агрессивности до безучастности.</p> <p><i>от 3 до 6 лет</i>: примирение со случившемся, отсутствие сопротивления, пассивная реакция на боль, болезненное отношение к замечаниям и критике, чрезмерная уступчивость, псевдовзрослое поведение, негативизм, агрессивность, лживость, воровство, жестокость по отношению к животным, склонность к поджогам.</p> <p><i>младший школьный возраст</i>: стремление скрыть причину повреждений, одиночество, отсутствие друзей, боязнь идти в школу или после школы домой.</p> <p><i>подростковый возраст</i>: побеги из дома, суицидальные попытки, криминальное или антиобщественное поведение, употребление алкоголя, наркотиков.</p>
	Сексуальное насилие	<ul style="list-style-type: none"> - повреждения генитальной, анальной или оральной областей, в том числе нарушение целостности девственной плевы, повреждения кожи груди или

	<p>бедер;</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширение ануса; - следы спермы на одежде, коже, в анальной и генитальной областях; - заболевания, передающиеся половым путем; - беременность; - повторные или хронические инфекции мочевыводящих путей; - резкие изменения веса; - вагинальные кровотечения; - психосоматические расстройства. 	<p>открытая мастурбация, несвойственные возрасту знания о сексуальном поведении, беспричинные нервно-психические расстройства.</p> <p><i>младший школьный возраст:</i> низкая успеваемость, замкнутость, стремление к уединению, изменение ролевого поведения (берет на себя роль родителя), ухудшение взаимодействия со сверстниками, сексуально окрашенное поведение, стремление полностью закрыть тело одеждой.</p> <p><i>подростковый возраст:</i> депрессия, побег из дома или институциональных учреждений, низкая самооценка, угрозы или попытки самоубийства, сексуализированное поведение, употребление алкоголя или наркотиков, проституция или беспорядочные половые связи, асоциальное и девиантное поведение.</p>
<p>Психологическое насилие</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задержка физического и умственного развития; - нервный тик; - энурез; - печальный вид; - соматические заболевания (ожирение, резкая потеря массы тела, язва желудка, кожные заболевания, аллергическая патология и т.д.). 	<ul style="list-style-type: none"> - беспокойство или тревожность; - нарушение сна; - длительно сохраняющееся подавленное состояние; - агрессивность; - склонность к уединению; - чрезмерная уступчивость, заискивающее, угодливое поведение; - угрозы или попытки самоубийства; - неумение общаться, налаживать отношения с другими людьми, включая сверстников; - низкая успеваемость; - пониженная самооценка; - нарушение аппетита.
<p>Пренебрежение</p>	<ul style="list-style-type: none"> - утомленный, сонный вид, опухшие веки; - санитарно-гигиеническая 	<ul style="list-style-type: none"> - постоянные голод и/или жажда; - кража пищи;

запущенность, педикулез;

- низкая масса тела, увеличивающаяся при регулярном достаточном питании (например, во время пребывания в больнице или приюте);

- задержка роста или общее отставание в физическом развитии;

- задержка речевого и моторного развития, исчезающая при улучшении ситуации и появлении заботы о ребенке;

- частая заболеваемость вялотекущими хроническими инфекционными болезнями;

- многократная госпитализация в отделения скорой помощи;

- повторные повреждения от случайных травм или отравлений.

- стремление привлечь к себе внимание взрослых любыми способами, вплоть до нанесения самоповреждений;

- подавленное настроение, апатия;

- пассивность;

- агрессивность и импульсивность;

- делинквентное (антиобщественное) поведение, вплоть до вандализма;

- неумение общаться с людьми, дружить;

- неразборчивое дружелюбие;

- регрессивное поведение;

- мастурбация;

- трудности в обучении, низкая успеваемость, недостаток знаний;

- низкая самооценка.